

BIOLOGIE - TEST 5 · CORRIGÉ

Synthèse des protéines et enzymes

Barème : 30 points. Note sur 6 = (points obtenus ÷ 30) × 5 + 1. Les réponses des questions ouvertes sont des réponses attendues : accepter toute formulation correcte équivalente.

PARTIE A : QCM (1 point par question)

1. Chez les cellules eucaryotes, où a lieu la **transcription** ? (1 pt)

- ☐ A. Dans le ribosome
- ☒ B. Dans le noyau
- ☐ C. Dans la mitochondrie
- ☐ D. Dans l'appareil de Golgi

Réponse : B. La transcription (synthèse d'un ARNm à partir d'un gène) a lieu dans le noyau. La traduction a lieu dans le cytoplasme, sur les ribosomes.

2. En quoi consiste la **traduction** ? (1 pt)

- ☐ A. Copier l'ADN avant la division
- ☐ B. Fabriquer un ARNm à partir d'un gène
- ☒ C. Lire l'ARNm avec le ribosome et assembler les acides aminés
- ☐ D. Condenser l'ADN en chromosomes

Réponse : C. La traduction est la lecture de l'ARNm par le ribosome et l'assemblage des acides aminés apportés par les ARNt.

3. Quelle molécule apporte les acides aminés au ribosome ? (1 pt)

- ☒ A. L'ARNt
- ☐ B. L'ADN
- ☐ C. L'ARNm
- ☐ D. L'amidon

Réponse : A. Les ARNt (ARN de transfert) sont chargés chacun d'un acide aminé.

4. Le codon **AUG** code pour quel acide aminé ? (1 pt)

- ☐ A. Phe
- ☐ B. Gly
- ☐ C. Ser
- ☒ D. Met

Réponse : D. AUG code pour la méthionine (Met), c'est aussi le codon de départ de la traduction.

5. Quel est le **substrat de l'amylase** ? (1 pt)

- ☐ A. Le glucose
- ☒ B. L'amidon
- ☐ C. La cellulose
- ☐ D. L'insuline

Réponse : B. L'amylase hydrolyse l'amidon en molécules plus petites, puis en glucose avec la maltase.

6. L'hémoglobine est une protéine composée de : **(1 pt)**

- ☐ A. 1 chaîne peptidique
- ☐ B. 2 chaînes peptidiques
- ☒ **C. 4 chaînes peptidiques**
- ☐ D. 20 chaînes peptidiques

Réponse : C. L'hémoglobine est composée de 4 chaînes peptidiques et de 4 groupes hème contenant chacun un atome de fer.

PARTIE B : QUESTIONS COURTES (2 points par question)

7. Définis la **transcription** et la **traduction**. **(2 pts)**

Transcription : synthèse d'un ARNm à partir d'un gène actif (de l'ADN) (1 pt).

Traduction : lecture de l'ARNm par le ribosome et liaison des acides aminés apportés par les ARNt pour former une chaîne peptidique (1 pt).

8. Voici un fragment du **brin codant** d'un gène (même séquence que l'ARNm, avec U à la place de T) : **ATG GCC AAA TTT**

Écris la séquence de l'ARNm correspondant. **(2 pts)**

AUG GCC AAA UUU (2 pts ; 0,5 pt par codon)

9. À l'aide du tableau du code génétique, traduis cet ARNm en acides aminés :

AUG CCU GAA AAG UGA **(2 pts)**

AUG = **Met**, CCU = **Pro**, GAA = **Glu**, AAG = **Lys**, UGA = **codon stop** (0,5 pt par acide aminé ; le codon stop ne code pour aucun acide aminé).

Chaîne peptidique : **Met - Pro - Glu - Lys**.

10. Chaque ARNt possède un **anticodon**. Écris l'anticodon qui s'apparie avec chacun de ces codons de l'ARNm :

AUG → **GGC** → **(2 pts)**

AUG → **UAC** (1 pt)

GGC → **CCG** (1 pt)

Appariement par complémentarité des bases : A-U et G-C.

11. Où se déroulent les étapes de la synthèse des protéines chez une cellule **eucaryote** et chez une cellule **procaryote** ? **(2 pts)**

Eucaryote : la transcription a lieu dans le noyau, la traduction dans le cytoplasme (sur les ribosomes). Les protéines sont ensuite modifiées dans le réticulum endoplasmique rugueux et l'appareil de Golgi (1 pt).

Procaryote : toutes les étapes se passent dans le cytoplasme, car il n'y a ni noyau ni organites (1 pt).

12. Qu'est-ce qu'une **enzyme** ? Quelle est sa nature chimique et quel est son rôle ? **(2 pts)**

Une enzyme est une **protéine** (1 pt) qui **catalyse** (accélère) une réaction chimique de la cellule (1 pt).

PARTIE C : QUESTIONS DÉVELOPPÉES (4 points par question)

- 13. La drépanocytose** (anémie falciforme) est due à une mutation du gène de l'hémoglobine. Voici le début du gène (brin codant) chez une personne saine et chez une personne malade :

Sain : GTG CAC CTG ACT CCT GAG GAG AAG

Malade : GTG CAC CTG ACT CCT GTG GAG AAG

- a) Écris la chaîne d'acides aminés dans chaque cas (utilise le tableau du code génétique, en lisant T comme U). (2 pts)
- b) Quelle est la différence entre les deux chaînes ? (1 pt)
- c) Pourquoi cette différence peut-elle rendre la protéine non fonctionnelle ? (1 pt) **(4 pts)**
- a) Sain : **Val - His - Leu - Thr - Pro - Glu - Glu - Lys** (1 pt). Malade : **Val - His - Leu - Thr - Pro - Val - Glu - Lys** (1 pt).
- b) Le 6^e acide aminé est différent : **Glu** (acide glutamique) est remplacé par **Val** (valine), à cause du remplacement de A par T dans le codon GAG qui devient GTG (1 pt).
- c) Un seul acide aminé différent peut modifier la structure 3D de la chaîne peptidique : l'hémoglobine ne prend plus la bonne forme, elle ne transporte plus correctement le dioxygène, les globules rouges sont déformés (en faucille) et la personne est anémique et fatiguée (1 pt).
- 14.** Explique comment une cellule fabrique une protéine, de la lecture du gène à la protéine fonctionnelle. Utilise les mots : *gène, ARNm, ribosome, ARNt, acides aminés, anticodon, chaîne peptidique*. **(4 pts)**
- 1 pt par étape claire et correcte :
- 1. Transcription** : dans le noyau, un gène actif est copié en ARNm, qui sort ensuite du noyau vers le cytoplasme.
 - Dans le cytoplasme, le **ribosome** lit l'ARNm codon par codon (3 bases).
 - Des **ARNt** chargés chacun d'un **acide aminé** viennent se placer en face des codons de l'ARNm : leur **anticodon** s'apparie par complémentarité (A-U et G-C).
 - Le ribosome crée des liaisons covalentes entre les acides aminés pour former une **chaîne peptidique** qui se replie dans l'espace en une protéine fonctionnelle (certaines protéines sont encore modifiées dans le RER et l'appareil de Golgi).
- 15.** L'**amylase** est une enzyme digestive qui découpe l'amidon en molécules de glucose.
- a) Quel est son substrat ? Quel est le produit de la réaction ? (2 pts)
- b) Pourquoi l'amylase ne peut-elle pas digérer la cellulose, même si la cellulose est aussi un glucide ? (2 pts) **(4 pts)**
- a) Substrat : **l'amidon** (1 pt). Produit : **le glucose** (par l'action de l'amylase puis de la maltase) (1 pt).
- b) Chaque enzyme possède un **site actif** qui reconnaît **spécifiquement** un substrat donné (1 pt). L'amylase reconnaît l'amidon mais pas la cellulose, dont la structure est différente (1 pt).

ANNEXE : Code génétique (codons de l'ARNm)

Lis le codon de l'ARNm : première base (colonne de gauche), deuxième base (colonne du haut), troisième base (colonne de droite). **Stop** = codon d'arrêt de la traduction. **Met** (AUG) est aussi le codon de départ. Dans le brin d'ADN codant, remplace T par U pour lire le codon.

1re base	2e base : U	2e base : C	2e base : A	2e base : G	3e base
U	UUU → Phe	UCU → Ser	UAU → Tyr	UGU → Cys	U
	UUC → Phe	UCC → Ser	UAC → Tyr	UGC → Cys	C
	UUA → Leu	UCA → Ser	UAA → Stop	UGA → Stop	A
	UUG → Leu	UCG → Ser	UAG → Stop	UGG → Trp	G
C	CUU → Leu	CCU → Pro	CAU → His	CGU → Arg	U
	CUC → Leu	CCC → Pro	CAC → His	CGC → Arg	C
	CUA → Leu	CCA → Pro	CAA → Gln	CGA → Arg	A
	CUG → Leu	CCG → Pro	CAG → Gln	CGG → Arg	G
A	AUU → Ile	ACU → Thr	AAU → Asn	AGU → Ser	U
	AUC → Ile	ACC → Thr	AAC → Asn	AGC → Ser	C
	AUA → Ile	ACA → Thr	AAA → Lys	AGA → Arg	A
	AUG → Met	ACG → Thr	AAG → Lys	AGG → Arg	G
G	GUU → Val	GCU → Ala	GAU → Asp	GGU → Gly	U
	GUC → Val	GCC → Ala	GAC → Asp	GGC → Gly	C
	GUA → Val	GCA → Ala	GAA → Glu	GGA → Gly	A
	GUG → Val	GCG → Ala	GAG → Glu	GGG → Gly	G